


Нарушения менструального цикла



Across

4. Лечение ложной аменореи
6. Менструации со скудным количеством теряемой крови (менее 40 мл)
7. Второй уровень регуляции менструального цикла
9. Лечение аменореи при синдроме Иценко-Кушинга
11. ... аменорея - отсутствие менструаций после их наличия, на фоне развития вторичных половых признаков
13. Значительно удлиненные менструальные циклы, выражающиеся крайне редкими менструациями (2-4 раза в год)

Down

1. Для какого синдрома характерны врожденные ил спорадические
2. Препарат, используемый в гормонотерапии при аменорее в случае гиперандрогении яичникового и надпочечникового генеза
3. В основе патогенеза первичной дисменореи находится относительная ...
5. Основная причина первичной истинной патологической аменореи вследствие нарушения функции гонад
8. Циклическое отторжение утолщенного функционального слоя эндометрия и выделение крови из матки

- 15.** Отсутствие менструации в течение 6 месяцев и более
- 16.** Для какой аменореи характерны астеноневротический, астенодепрессивный или астеноипохондрический синдромы?
- 10.** Очень редкие менструации (через 6-8 недель)
- 12.** Гипоменструальный синдром проявляется снижением функции яичников
- 14.** Данный препарат, содержащий гонадотропины ФСГ и ЛГ, стимулирует созревание фолликулов и овуляцию